

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław		
Wersja: 17	SOP NR 23/172/GAB LEK TERENY ZAGROŻONE ZAKAŻENIEM CHOROBY PRZENOSZONYMI PRZEZ KREW	
Data wersji: 04.10.2017 r.		
Strona: 1/4		

1. Przedmiot i cel: Prawidłowa kwalifikacja dawcy krwi i kandydata na dawcę krwi.
Ocena ryzyka przeniesienia zakażenia drogą transfuzji krwi lub jej składników.

2. Zakres stosowania: Dawca krwi lub kandydat na dawcę krwi.

3. Odpowiedzialność:

Osoba kwalifikująca dawców krwi i kandydatów na dawców krwi.

4. Zasady ogólne:

4.1 Osoby powracające z terenów, na których występuje ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew, podlegają dyskwalifikacji tymczasowej w zależności od rodzaju czynnika zakaźnego.

4.2 W przypadku pobytu za granicą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed oddaniem krwi dawca/kandydat na dawcę powinien ten fakt zgłosić lekarzowi.

5. Sposób postępowania:

5.1 Dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy

od chwili opuszczenia terenów występowania **malarii / wirusa Ebola:**

kraje Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, częściowo Grecja

-szczegółowy wykaz krajów znajduje się w SOP nr 16/172/GAB LEK

5.2 Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy

od chwili opuszczenia terenów:

5.2.1 gdzie występują inne choroby tropikalne, w tym **gorączka krymsko-kongijska** (okręg **Korcza w Albanii**),

5.2.2 gdzie występuje **AIDS** (Kraje Afryki Środkowej i Zachodniej, Tajlandia)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław		
Wersja: 17	SOP NR 23/172/GAB LEK TERENY ZAGROŻONE ZAKAŻENIEM CHOROBY PRZENOSZONYMI PRZEZ KREW	
Data wersji: 04.10.2017 r.		
Strona: 2/4		

5.3 Dyskwalifikacja na okres 28 dni

od chwili opuszczenia terenów zagrożonych zakażeniem:

gorączką **Denga, Chikungunya, Zika, i Wirusem Zachodniego Nilu**

Aktualnie są to kraje lub obszary:

5.3.1 EUROPA:

- **Albania**- okręg **Lezha**
- **Austria**- obszar 3 krajów związkowych: **Wiedeń, Dolna Austria** (ze stolicą- Sankt Poelten) i **Burgenland** (ze stolicą -Eisenstadt)
- **Bośnia i Hercegowina**
- **Bulgaria**
- **Chorwacja**- poza obszarami nadmorskimi
- **Cypr**
- **Czarnogóra** (rejon **Podgoricy**)
- **Francja** - departament :Var (**Tulon**) w Prowansji oraz Delta Rodanu (**Marsylia**), Gard (**Nimes**), Herault (**Montpellier**) na Lazurowym wybrzeżu
- **Grecja** (uwzględnić tereny występowania malarii!)
- **Hiszpania** - południowa część kraju (Sevilla)
- **Kosowo**
- **Madera** /Portugalia/
- **Portugalia** - rejon **Lizbony** i miasta **Setubal** w środkowej części kraju oraz rejon **Algarve** - dystrykt Faro
- **Rosja**- regiony w pobliżu Morza Kaspijskiego; obwody: Wołgogradzki, Samarski, Woroneski, Lipecki, Saratowski, Astrachański, Rostowski, Kraj Krasnodarski, Czelabiński, Nowosybirsk i Tatarstan, a także rejony nad Morzem Azowskim i w dolnym biegu Donu (Rostów, Woroneż)
- **Rumunia**
- **Sardynia**
- **Serbia**
- **Turcja**
- **Ukraina**- obwód **Czerkaski**, region **Doniecka** i **Zaporoża**
- **Węgry**
- **Włochy** - północno- wschodnie Włochy- regiony:

Emilia Romania: Bolonia, Ferrara, Cesena, Parma Rawenna, Modena, Rimini, Pienca, Rovigo, Parma, Reggio nell'Emilia

Venetto (Wenecja Euganejska): Mestre, Padwa, Werona, Vicenza, Wenecja

Lombardia: Mediolan, Bergamo, Pavia, Como Cremona, Brescia, Lodi, Mantowa

Friuli Venezia Giulia (Wenacja Julijska): Trest, Udine, Gorycja , Pordenone.

Piemont: Novara

Sycylia- prowincja Trapani

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław		
Wersja: 17	SOP NR 23/172/GAB LEK TERENY ZAGROŻONE ZAKAŻENIEM CHOROBY PRZENOSZONYMI PRZEZ KREW	
Data wersji: 04.10.2017 r.		
Strona: 3/4		

Gmina Anzio w regionie Lacjum, w prowincji Rzym

5.3.2 AMERYKA PÓŁNOCNA:

- **Kanada**
- **Meksyk** (częściowo tereny malaryczne), wyspa **Guadalupe**
- **USA (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)**

5.3.3 AMERYKA ŚRODKOWA: cały obszar wraz z wyspami (uwzględnić tereny występowania malarii!)

5.3.4 AMERYKA POŁUDNIOWA: cały obszar kontynentu oprócz Urugwaju i Chile:

Argentyna, Aruba, Brazylia (częściowo tereny malaryczne), Ekwador (częściowo tereny malaryczne), Gujana (częściowo tereny malaryczne), Gujana Francuska (częściowo tereny malaryczne), Kolumbia (częściowo tereny malaryczne), Paragwaj (częściowo tereny malaryczne), Peru (częściowo tereny malaryczne), Surinam (częściowo tereny malaryczne), Trinidad i Tobago, Wenezuela (częściowo tereny malaryczne),

5.3.5 AFRYKA:

- **Egipt**- dystrykt Daiyrou, prowincja Assuit
- **Tunezja**
- **Wyspy Zielonego Przylądka** (malaria na wyspie Sao Tiago)

5.3.6 AZJA:

- **Filipiny**-częściowo tereny malaryczne
- **Indonezja**- częściowo tereny malaryczne
- **Izrael**
- **Malediwy**
- **Malezja** - częściowo tereny malaryczne
- **Singapur**
- **Syria** -Al Qunaytirah (okolice Damaszku)
- **Tajlandia**- częściowo tereny malaryczne
- **Wietnam**- częściowo tereny malaryczne

5.3.7 OCEANIA (częściowo tereny malaryczne)

- **Melanezja**-wyspy
- **Mikronezja**-wyspy
- **Polinezja Francuska**
- **Tonga**
- **Samoa, Samoa Amerykańskie**
- **Wyspy Cooka**
- **Wyspy Marshalla**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław		
Wersja: 17	SOP NR 23/172/GAB LEK TERENY ZAGROŻONE ZAKAŻENIEM CHOROBY PRZENOSZONYMI PRZEZ KREW	
Data wersji: 04.10.2017 r.		
Strona: 4/4		

5.4 W przypadku pobytu partnera seksualnego dawcy krwi/kandydata na dawcę na terenie zagrożonym zakażeniem wirusem Zika:

5.4.1 jeśli partner seksualny jest mężczyzną i przebywał w ciągu ostatnich 6 miesięcy na terenie występowania zakażeń wirusem Zika,

5.4.2 jeśli partner seksualny jest kobietą, która przebywała w ciągu ostatnich 2 miesięcy na terenie występowania zakażeń wirusem Zika

dawca krwi / kandydat na dawcę podlega dyskwalifikacji na okres 28 dni.

-zalecenia te (pkt.5.4) nie dotyczą krwiodawców oddających wyłącznie osocze do frakcjonowania

Tereny zagrożone zakażeniem wirusem Zika: Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize, Boliwia, Bonaire, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Dominika, Dominikana, Ekwador, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gujana, Gujana Francuska, Grenada, Guadalupe, Gwatemala, Gwinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Kambodża, Kamerun, Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Malediwy, Malezja, Martynika, Meksyk, Mikronezja, Montserrat, Nikaragua, Nigeria, Palau, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Saint Barthelemy, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Samoa Amerykańskie, Senegal, Singapur, Sint Eustatius i Saba, Sint Maarten, Surinam, Tajlandia, Trinidad i Tobago, Tonga, Turks i Caicos, Uganda, USA (Miami-Dade, Broward, Cameron, Palm Beach), Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Zielonego Przylądka,

Źródło: 1) ecdc.europa.eu

2) www.who.int

SOP nr 23/172/GAB LEK wersja 17 obowiązuje od dnia 04.10.2017 r.

Opracował
data...

Sprawdził
data.....

Zatwierdził
data

Weryfikował
data.....