

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław		
Wersja: 2	ULOTKA INFORMACYJNA O KRWI i JEJ SKŁADNIKACH OSOCZE O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI KRIOPRECYPITATU	
Data wersji: 03.04.2023 r.		
Strona 1 z 2		

1. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której wykonano składnik:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2. Nazwa składnika krwi:

Osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu zwane dalej osoczem.

Osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu pozostaje po usunięciu krioprecypitatu i zawiera ono: albuminę, immunoglobulinę i czynniki krzepnięcia występujące w osoczu świeżo mrożonym (fresh frozen plasma-FFP) – z wyjątkiem cz. V, VIII i fibrynogenu, których stężenie jest znacznie niższe niż w FFP.

3. Rodzaj płynu:

CPD

<i>zawartość składników w 1000 ml roztworu CPD</i>	
<i>Cytrynian trójsodowy</i>	<i>26,30g</i>
<i>Kwas cytrynowy</i>	<i>5,25g</i>
<i>Glukoza</i>	<i>25,5g</i>
<i>Dwuwodofosforan sodowy</i>	<i>2,22g</i>

4. Zalecenia dotyczące warunków transportu:

4.1. Osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu transportować w stanie zamrożenia w temperaturze zgodnej z temperaturą przechowywania. Jeżeli w przypadku składnika krwi przechowywanego w temperaturze -25°C nie jest możliwy transport zgodny z temperaturą przechowywania, to transportować składnik w temperaturze poniżej -18°C .

4.2. Rozmrożone osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu transportować w temperaturze powyżej 2°C , ale nie przekraczającej 10°C .

5. Wskazówki dotyczące przechowywania, przygotowania do transfuzji oraz sposobu przetaczania:

5.1. Osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu należy przechowywać w zamrażarkach lub mroźniach w temperaturze -25°C lub niższej.

5.2. Termin ważności osocza o obniżonej zawartości krioprecypitatu przechowywanego w temperaturze poniżej -25°C wynosi 36 miesięcy.

5.3. Osocze należy rozmrażać w temperaturze $+37^{\circ}\text{C}$ przy użyciu sprzętu umożliwiającego kontrolę temperatury rozmrażania, w suchym podgrzewaczu lub łaźni wodnej

5.4. Osocze rozmrożone przeznaczone do przetoczenia w przypadku, gdy nie jest możliwe natychmiastowe jego przetoczenie, może być przechowywane przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 6°C .

5.5. Składnik należy przetaczać z zachowaniem zgodności grupy krwi ABO.

5.6. Przetaczać przez filtr 170÷200 μm

5.7. Czas przetoczenia jednej jednostki FFP nie powinien trwać dłużej niż 30 minut. W przypadku wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową oraz dzieci z niewydolnością krążenia zabieg przetoczenia jednej jednostki osocza powinien trwać jak najkrócej, a w przypadku konieczności związanej ze stanem klinicznym pacjenta może być wydłużony do dwóch godzin.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław		
Wersja: 2	ULOTKA INFORMACYJNA O KRWI i JEJ SKŁADNIKACH OSOCZE O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI KRIOPRECYPITATU	
Data wersji: 03.04.2023 r.		
Strona 2 z 2		

5. Wskazania do stosowania:

Jedynie w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP - Thrombotic Thrombocytopenic Purpura)!

6. Informacje o przeciwwskazaniach:

- 6.1. U chorych z nadwrażliwością na białka osocza, brak lub niedobór IgA.
- 6.2. Nie jest zalecane do rutynowego stosowania klinicznego ze względu na możliwość przeniesienia zakażenia bakteryjnego i na dostępność bezpieczniejszych składników i produktów.

7. Informacje o konieczności zachowania środków ostrożności podczas stosowania:

- 7.1. Kontrola jakości obejmuje: ocenę szczelności pojemnika, ocenę wizualną – brak przebarwień, skrzepów, lipemii.
- 7.2. Można przetaczać tylko osocze po karencji. Informacja o karencji znajduje się na etykiecie osocza.
- 7.3. Po rozmrożeniu, nie wolno zamrażać powtórnie.

8. Informacje o możliwych niepożądanych reakcjach poprzetoczeniowych:

- 8.1. Niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe (dreszcze, gorączka, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny).
- 8.2. Przeniesienie zakażenia wirusowego (HBV, HCV, HIV, itp.).
- 8.3. Przeniesienie zakażenia innymi czynnikami zakaźnymi, które nie są badane lub rozpoznane,
- 8.4. Posocznica (spowodowana zakażeniem bakteryjnym składnika).
- 8.5. Zatrucie cytrynianem, gdy szybko przetoczy się dużą objętość osocza.
- 8.6. Ostra poprzetoczeniowa niewydolność oddechowa (TRALI).
- 8.7. Przeciążenie krążenia.
- 8.8. Reakcje alergiczne i anafilaktyczne.